

Сигналізаційне повідомлення №2 від 01.06.2026 р.

Під час проведення обстежень встановлено, що на феромонну пастку потрапило 7 екз. метеликів яблуневої плодожерки. Погодні умови сприяють інтенсивному льоту метеликів яблуневої та інших плодожерок, дружному відкладанню ними яєць та відродженню личинок. Тому у садах необхідно провести комплекс захисних заходів у відповідності до вимог Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.



При відлові феромонними пастками протягом 7 днів спостережень 5 метеликів яблуневої або однієї східної плодожерки, на початку відкладання ними яєць застосовують інсектициди, які містять феноксикарб, люфенурон, феноксикарб + люфенурон; через 3-5 днів після відлову 5 метеликів за 7 днів – тefлубензурон, новалурон та інші. Всі гормональні препарати мають стерилізуючий ефект (стерилізують імаго), овіцидну дію (знищують яйця) та безпосередньо



ларвіцидну дію (знищують личинок). Препарати на основі феноксикарбу та люфенурону додатково діють на кліщів, щитівок, листокруток, молей. Наступні обприскування здійснюють не раніше, як інсектицид (хімічний або біологічний) від попереднього обприскування втратить токсичну дію.

В разі розвитку хвороб плодових рекомендовано додавати проти парші фунгіциди на основі манкоцебу, каптану, метираму, додину, фосфіту алюмінію + фосфористої кислоти, проти борошнистої роси фунгіциди з сіркою.

За можливості слід надавати перевагу біологічним методам боротьби. Доцільно використовувати яйцеїда-трихограму в нормі 50 тис./га у три строки – на початку відкладання яєць, на початку масового відкладання і через 5-7 днів після другого. Можна вносити у два строки - на початку відкладання яєць та приблизно через 7 днів в період масової яйцекладки, але в разі несприятливих погодних умов (посуха або вітряна дощова погода) її ефективність зменшується. Випускають трихограму в ранкові години у теплу безвітряну погоду. Також доцільно використовувати біопрепарати Віплант, РК, Гаупсил-Д, р. та інші.

Необхідно обов'язково враховувати, що біля садів активно цвіте акація та інші рослини, які є медоносами, тому використання пестицидів під час льоту бджіл призведе до їх знищення. При використанні засобів захисту рослин, особливо хімічних (інсектицидів, фунгіцидів, гербіцидів та ін.) слід безумовно дотримуватись вимог законів України «Про захист рослин», «Про пестициди і агрохімікати», «Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин», «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», нормативно правових актів у сферах санітарної безпеки, охорони праці та навколишнього середовища. На присадибних ділянках дозволено використовувати лише пестициди, які призначені для роздрібного продажу населенню.

Усі роботи із засобами захисту рослин слід проводити у вечірні та ранкові години в період відсутності льоту бджіл при мінімальних висхідних повітряних потоках за швидкості вітру до 4 м/с. В разі обробки засобами захисту рослин присадибних ділянок необхідно обов'язково забезпечити безпеку мешканців прилеглих територій від шкідливого впливу пестицидів.