

Сигналізаційне повідомлення №4 від 11.06.2026 р.

На початку першої декади червня відмічено початок відродження личинок **колорадського жука** у південній частині області, а також пошкодження ними надземних пагонів рослин картоплі.

Обробку інсектицидами рекомендується розпочинати, коли 8-10% кущів картоплі заселені личинками 1-2 віків у кількості 10-20 особин на один кущ.



фото з відкритих джерел

Для боротьби з цим шкідником використовують інсектициди, що містять тіаклоприд, тетраніліпрол, клотіанідин, лямбда-цигалотрин, імідаклоприд, хлорантраніліпрол, ацетаміприд, тefлубензурон, новалурон, зета-циперметрин, циперметрин + хлорпірифос, імідаклоприд + біфентрин, лямбда-цигалотрин + тіаметоксам, імідаклоприд + бета-цифлутрин, новалурон + ацетаміприд, імідаклоприд + альфа-циперметрин + ацетаміприд;

біопрепарати Агрінсекта, р., Актофіт, КЕ, Скарадо-М, ЗП, інші

препарати відповідно до Переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні..

Боротьбу колорадським жуком слід проводити ще й на насадженнях томатів але із врахуванням терміну від обробки рослин пестицидом до початку вживання томатів.

Під час використання засобів захисту рослин необхідно суворо дотримуватися вимог законодавства України, зокрема законів «Про захист рослин», «Про пестициди та агрохімікати», а також положень «Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин» і «Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Окрім цього, слід керуватися нормативно-правовими актами, що регулюють питання санітарної безпеки, охорони праці та захисту навколишнього середовища.

Усі роботи із застосуванням засобів захисту рослин рекомендується виконувати в ранкові або вечірні години, коли бджоли неактивні. Варто пам'ятати, що для бджіл можуть бути шкідливими не тільки інсектициди, а також інші види пестицидів (фунгіциди та гербіциди та ін.). Заборонено використовувати пестициди за умов мінімальних висхідних повітряних потоків і швидкості вітру понад 4 м/с. Необхідно обов'язково враховувати, що в період застосування пестицидів, навіть на полях, де відсутні медоноси, в радіусі 10 км можуть перебувати квітучі дикорослі рослини (квітучі дикорослі дерева, різнотрав'я тощо), до яких будуть перелітати бджоли через поля, які обробляються, тому необхідно обов'язково враховувати такі ризики.

Під час догляду за присадибними ділянками важливо уникати потрапляння пестицидів на рослини та ягоди, призначені для споживання в їжу, а також запобігати перенесенню пестицидного шлейфу на сусідні ділянки.

В.о. начальника управління
фітосанітарної безпеки, начальник
відділу карантину рослин

підписано

Віталій ЖОСАН

Начальник відділу
захисту рослин, фітосанітарної
діагностики та прогнозування

підписано

Сергій ФРАНКОВ