

Сигналізаційне повідомлення №5 від 22.06.2026 р.

На присадибних ділянках продовжується поширення білокрилки. Це – дрібні комахи, які пошкоджують багато культур - помідори, огірки, салат, селеру, квасоллю, декоративні рослини.



Білокрилка завдає шкоди овочевим, ягідним, плодовим, декоративним рослинам та кормовим культурам, активна як у відкритому ґрунті, так і в



тепличних умовах. Небезпеку для рослин становлять личинки білокрилок, які на стадії обмеженої рухливості присмоктуються до соковитих частин рослини і харчуються його соками. Личинки різного віку живляться клітинним соком рослин, виділяючи при цьому цукроподібні речовини – падь, яка стає сприятливим середовищем для розвитку патогенів, грибів (наприклад, кладоспоріум). Найбільша шкідливість комах спостерігається в кінці літа – на початку осені.

Личинки білокрилка овальні, прозорі із зеленуватим відтінком, дуже дрібні, розмір не перевищує 0,2-3 мм (залежно від виду), тому виявити їх досить складно. За період яйцекладки, який триває 25-35 днів, самиця відкладає до 130-250, максимально до 500 яєць. За різних погодних умов може дати 4-12 поколінь.

Мешкають, як правило, у вологих тінистих місцях, особливо часто зустрічаються на нижній стороні листя рослин. На зиму йдуть пупарії або імаго, залишаючись у ґрунті (під листям, травою, грудками землі) до настання весни, личинки – гинуть.

Для контролю чисельності білокрилки на овочевих культурах в Україні дозволено використання інсектицидів на основі піриміфос-метилу, ацетаміприду, імідаклоприду, абамектину, циантраніліпролу, піриміфос-метилу + піридабену + ацетаміприду; біологічні препарати інсектицидної дії INSECTA BBM, ЗП, ЛАЛГАРД М52, МД, Препарат інсектоакарицидний біологічного походження «Актарофіт, КЕ», інші препарати відповідно до Переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні.

Усі роботи із застосуванням засобів захисту рослин рекомендується виконувати в ранкові або вечірні години, коли бджоли неактивні. Варто пам'ятати, що для бджіл можуть бути шкідливими не тільки інсектициди, а також інші види пестицидів (фунгіциди та гербіциди та ін.). Заборонено використовувати пестициди за умов мінімальних висхідних повітряних потоків і швидкості вітру понад 4 м/с. Необхідно

обов'язково враховувати, що в період застосування пестицидів, навіть на полях, де відсутні медоноси, в радіусі 10 км можуть перебувати квітучі дикорослі рослини (квітучі дикорослі дерева, різнотрав'я тощо), до яких будуть перелітати бджоли через поля, які обробляються, тому необхідно обов'язково враховувати такі ризики.

Слід пам'ятати, що власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров'я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше, тому необхідно враховувати, що обробка пестицидом присадибної ділянки потребує обережності: необхідно уникати потрапляння пестицидів на рослини та ягоди, призначені для споживання в їжу, а також запобігати перенесенню пестицидного шлейфу на сусідні ділянки.

**В.о. начальника управління
фітосанітарної безпеки, начальник
відділу карантину рослин**

підписано

Віталій ЖОСАН

**Начальник відділу
захисту рослин, фітосанітарної
діагностики та прогнозування**

підписано

Сергій ФРАНКОВ