

Сигналізаційне повідомлення №6
від 09.07.2026 р.



В області спостерігається літ **кукурудзяного стеблового метелика**. На світлову пастку за ніч уловлюється від 2 до 8 екз. метеликів.

Літ метеликів збігається з



початком викидання волоті кукурудзи. Через 3-5 днів самки відкладають яйця купками по 15-20 шт. на нижній бік листків, у середньому до 400 яєць кожна, максимально 1200 яєць. Фаза яйця продовжується 3-15 днів, а весь період яйцекладки – 15-25 днів, причому основна маса яєць

відкладається в першій половині цього терміну.

У перші дні після відродження гусениці живуть на поверхні рослин, потім через пазуху листків потрапляють у середину стебла. Температурний оптимум розвитку гусениць 23-28°C, нижній поріг відносної вологості 80%. На час збирання врожаю гусениці перебувають переважно в нижній частині стебел.

Стримати розповсюдження шкідника в період льоту метеликів може суха жарка погода, проте на сьогоднішній день такі умови не спостерігаються, тому існує небезпека створення загрози посівам кукурудзи та інших товстостебельних культур.

Для контролю цього шкідника ефективним є використання біологічного методу захисту рослин - випуск на поля трихограми. Трихограму в кількості 50-100 тис. самиць на 1 га випускають на початку відкладання яєць шкідником. В період масового відкладання яєць (приблизно через 2 тижні після початку, залежно від погодно-кліматичних умов) випуск трихограми проводять повторно.

Через складність у виявленні яйцекладок можливо визначити приблизний час початку відкладання яєць, який настає на п'ятий-восьмий день після початку відлову самців у феромонні пастки. Надалі рекомендується проводити повторні випуски кожні 4-5 днів, а при розтягнутому періоді льоту – кожні 5-7 днів. Особливо це важливо за несприятливих умов для життєдіяльності трихограми, таких як посуха або вітряна дощова погода, коли її активність істотно обмежена до 3-5 діб. Якщо ж умови сприятливі для розвитку трихограми, тобто помірна погода з гідротермічним коефіцієнтом 0,9-1,2,

достатньо провести два випуски. Подальший контроль над шкідником забезпечується за рахунок природного відтворення яйцеїда.

З урахуванням розбіжності в термінах льоту метеликів, внесення трихограми на кукурудзі також буде ефективним у боротьбі з бавовниковою совкою.

На території Вінницької області працюють біолабораторії, що виробляють трихограму: ТОВ «Вінницька біолабораторія», ПП «Томашпільська біолабораторія», ТОВ «Чернівецька біолабораторія».

Під час вегетації використовують біопрепарати Біопрепарат «Ленідоцид», в.р., ТМ «Губернаторська» марки «Фітодоктор -Гарбо», ТМ «Губернаторська» марки «Фітодоктор-Голд». За заселеності більше 18% рослин яйцекладками або 6-8% рослин гусеницями кукурудзяного метелика використовують хімічні препарати на основі альфа-циперметрину, дельтаметрину, флубендіаміду, дифлубензуруну, лямбда-цигалотрину, хлорантраніліпролу, тетраніліпролу, хлорпірифосу, імідаклоприду + біфентринк, імідаклоприду + лямбда-цигалотрину, новалурону + біфентрину, лямбда-цигалотрину + тіаметоксаму, хлорантраніліпролу + лямбда-цигалотрину та інших відповідно до Переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні.

Усі роботи із застосуванням засобів захисту рослин рекомендується виконувати в ранкові або вечірні години, коли бджоли неактивні. Варто пам'ятати, що для бджіл можуть бути шкідливими не тільки інсектициди, а також інші види пестицидів (фунгіциди та гербіциди та ін.). Заборонено використовувати пестициди за умов мінімальних висхідних повітряних потоків і швидкості вітру понад 4 м/с. Необхідно обов'язково враховувати, що в період застосування пестицидів, навіть на полях, де відсутні медоноси, в радіусі 10 км можуть перебувати квітучі дикорослі рослини (квітучі дикорослі дерева, різнотрав'я тощо), до яких будуть перелітати бджоли через поля, які обробляються, тому необхідно обов'язково враховувати такі ризики.

Слід пам'ятати, що власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров'я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше, тому необхідно враховувати, що обробка пестицидом присадибної ділянки потребує обережності: необхідно уникати потрапляння пестицидів на рослини та ягоди, призначені для споживання в їжу, а також запобігати перенесенню пестицидного шлейфу на сусідні ділянки.

**Начальник управління
фітосанітарної безпеки**

підписано

Наталія САМБОРСЬКА

**Начальник відділу
захисту рослин, фітосанітарної
діагностики та прогнозування**

підписано

Сергій ФРАНКОВ