

Сигналізаційне повідомлення №7

від 15.07.2026 р.

У результаті поєднання дощів із помірними температурними показниками на окремих посівах соняшнику спостерігається поява білої гнилі (склеротініозу). Для розвитку цього патогена сприятливими є висока відносна вологість повітря, близько 80 %, і температура в межах +18-25 °С.



Симптоми прояву хвороби на вегетативних органах залежать від періоду зараження і фази розвитку рослин. У період бутонізації-цвітіння соняшнику на прикореневій частині стебла уражених рослин проявляються плями буроватого кольору, мокрі на дотик. У вологу погоду на плямах з'являється білий повстятий наліт міцелію гриба, листя при цьому в'януть і вся рослина засихає. Пізніше уражена тканина стебла трухне, і в ній утворюються чорні, щільної консистенції і різні за формою утворення - склеротії патогена. Симптоми хвороби відмічаються в середній частині стебла у вигляді бурих мокріючих плям з білим нальотом міцелію гриба при підвищеній

вологості, а за посушливих умов на уражених стеблах з'являються безбарвні плями, що розміщуються концентричними колами. Прояв білої гнилі на кошиках відбувається частіше в кінці цвітіння або у фазі пожовтіння кошиків. На їх тильному боці з'являються блідо-коричневі плями, тканина стає мокрою і легко продавлюється. При досяганні уражений кошик розтріскується, у місцях плям формується білий повстятий наліт міцелію гриба, який заповнює простір між сім'янками. Насіння всередині темніє і стає гірким на смак.

Для запобігання поширення цієї хвороби аграрникам необхідно постійно слідкувати за появою та поширенням цієї хвороби, адже своєчасне виявлення цих симптомів є важливим для оперативного реагування та запобігання значним втратам врожаю.

Для боротьби з цією хворобою на початку та в кінці цвітіння проводять обприскування фунгіцидами, що містять діючу речовину азоксистробін, боскалід, дифеноконазол, мефентрифлуконазол, пікоксістробін, піраклостробін, протіоконазол, тебуконазол, тетраконазол, тіофанат-метил, флуопірам, ципроконазол та ін.; **біопрепарати** Флорабацилін, с., Поліверсум, п., Фітоцид, КС, інші препарати згідно Переліку про пестициди і агрохімікати.

В разі необхідності рекомендовано підсушувати кошики у фазі біологічної стиглості десикантами. На полях, де рослини уражені гнилями, слід почати обробку трохи раніше, ніж там, де гнилі відсутні.

Усі роботи із застосуванням засобів захисту рослин необхідно виконувати після завчасного попередження населення про застосування пестицидів, в ранкові або вечірні години, коли бджоли неактивні. Варто пам'ятати, що для бджіл можуть бути шкідливими не тільки інсектициди, а також інші види пестицидів (фунгіциди та гербіциди та ін.). Заборонено використовувати пестициди за умов швидкості вітру понад 4 м/с.

Обов'язковою вимогою є використання засобів індивідуального захисту під час роботи з пестицидами та дотримання техніки безпеки.

Начальник управління
фітосанітарної безпеки

підписано

Наталія САМБОРСЬКА

Начальник відділу
захисту рослин, фітосанітарної
діагностики та прогнозування

підписано

Сергій ФРАНКОВ